




REPÈRES Stades phénologiques et désherbage mécanique du maïs



HE = Herse étrille / HR = Houe rotative

Repères somme de température stade phénologiques du maïs (base 6° C)

Levée : **80 DJ à partir du semis + 20-50 DJ si semis sur sol < 10°C**

3 feuilles : **200 DJ à partir du semis**

Repères phénologiques des prairies

Sur nos stations météo nous avons entre 750 et 850 DJ. Dans ces conditions environ 21% des graminées présentes dans les prairies permanentes se trouvent au stade épisaison. C'est le bon moment pour une fauche à haute valeur alimentaire. Les espèces les plus précoces (vulpin) sont déjà épiées. C'est le début d'épisaison pour le Dactyle, la fétuque et le RGA précoce. Pour le fléole et les variétés tardives de RGA nous nous trouvons en pleine montaison.

Historique des stations

MONTEBOURG

LES LOGES SUR BRECEY

VILLERS BOCCAGE

LISEUX

BERNAY

BREAUTE

NEUFCHATEL EN BRAY

Bilan pluviométrique (cumul en mm)

	Semaine écoulée*	16	12	8	14	17	5	9
	4 dernières semaines*	29	34	28	34	38	22	30
	Référence 2020	80	72	63	74	39	58	43
Références météo France	AVRIL 1981-2010	63	75	62	62	57	69	58
	MAI 1981-2010	57	84	71	70	60	74	66

Bilan des températures (Σ °jour)

	Semaine écoulée* (base 0)	52	53	51	48	51	47	47
	Depuis le 1er/01/2021 (base 0)	869	860	822	764	796	760	739
	Référence 2020	1082	1141	1073	1040	1032	1035	1002
Références météo France	AVRIL 1981-2010	916	865	841	883	752	764	720
	MAI 1981-2010	1313	1284	1238	1305	1152	1158	1116

* semaine de référence du vendredi au jeudi